

Afrikansk svinpest

Vad ska du som grisföretagare tänka på

- Se till att dina djur inte kan få i sig matavfall
- Ring veterinär vid plötsliga oförklarliga dödsfall
- Personer som varit på grisbesättningar utomlands får inte besöka din besättning inom 48 timmar och ska ha rena kläder och skor.
- Har du anställda från något riskområde som i Ukraina, Vitryssland Georgien eller Ryssland, så ge noggranna instruktioner om att de inte får ta med sig kött och köttprodukter och inte följer tidsgränsen ovan om de besökt grisgårdar i hemlandet.

Bakgrund

Afrikansk svinpest är en mycket allvarlig virussjukdom som drabbar tam- och vildsvin, och som har sitt historiska utbredningsområde i östra och södra Afrika. Sjukdomen introducerades till Georgien 2007, troligen via infekterat matavfall från ett lastfartyg, och är nu etablerad i stora delar av Kaukasien och Ryssland. Bara från Ryssland har över 500 utbrott rapporterats sedan 2008, och sjukdomen kommer allt närmare EU:s gränser och Norden. Under 2012 rapporterades ett första utbrott från Ukraina och under sommaren två utbrott från Vitryssland, så nära som fyra mil till Litauens gräns och tolv mil till Polen. Smittan är inte under kontroll, och risken för vidare spridning till EU, till exempel med olagligt importerat svinkött eller med infekterade vildsvin, anses idag hög. Det finns inget fungerande vaccin.

Afrikansk svinpest smittar inte människan.

Symtom

Den akuta form av afrikansk svinpest som idag cirkulerar i Ryssland, börjar vanligtvis med hög feber som följs av upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd. **Det kan gå så fort att man bara ser döda djur.** Dräktiga suggor kastar vanligen på ett tidigt stadium. Huden kan bli blåaktigt missfärgad på delar av kroppen, i synnerhet i ben, mage och öron. Gången är ostadig och okoordinerad. Andningssvårighet, ögonflöde, kräkningar, förstoppning som övergår i diarré samt blödningar från mun och ändtarm är andra symtom som kan ses hos vissa djur. Det är inte ovanligt att upp till 80 % av djuren dör inom 5-10 dagar.

Smittvägar

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur (tamsvin eller vildsvin), eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar eller redskap. Virusets överlevnad under mycket lång tid i icke värmebehandlade köttprodukter såsom rökta eller torkade

skinkor, salami eller bacon, varför **utfodring med okokt matavfall som innehåller fläskprodukter från infekterade områden kan utgöra en mycket stor smittrisk.**

Människor som rest i infekterade områden ska vara särskilt försiktiga och inte gå in i grisstallar på minst fem dagar efter hemkomst. Det finns olaglig import av kött och köttprodukter till EU. Dessa kan innehålla smitta och får inte slängas så att vildsvin kan komma åt rester. Djurtransporter som varit i infekterade områden ska rengöras och desinficeras trots att det kan vara problematiskt vintertid.

Om man misstänker sjukdomen

Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Man måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade svin. Misstänkt smittade djur får absolut inte flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig.


Mer råd och information

[Svenska Djurhälsovården har tagit fram råd för vad man ska tänka på och information på flera språk för utländsk arbetskraft.](http://www.svdhv.org/sv/aktuellt/nyheter/e/546/svinpesten-kommer-narmare--skydda-din-gard/)
<http://www.svdhv.org/sv/aktuellt/nyheter/e/546/svinpesten-kommer-narmare--skydda-din-gard/>

Ytterligare information finns på SVAs hemsida

<http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Epizootier/Afrikansk-svinpest1/>

Aktuell utbredning i vårt närområde



Källa: OIE